

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 18-2-69 893298

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION CHAMPAGNE

(ARDENNES, AUBE, HAUTE-MARNE, MARNE)

5, Place Paul Jamot - 51-REIMS - Tél. 47.22.87

ABONNEMENT ANNUEL : 95 F
C.C.P. CHALONS-sur-MARNE 2.800.67 W
Régisseur de Recettes de la Direction
Départementale de l'Agriculture
à Châlons-sur-Marne

BULLETIN N° 101 de FEVRIER 1969

17 février 1969 / n° 2

TRAITEMENT D'HIVER DES ARBRES FRUITIERS

Ces traitements appliqués dans le courant de l'hiver ne se justifient que dans les plantations où les applications d'insecticides ou de fongicides ont été délaissées pendant quelque temps. Ces arbres peuvent donc être couverts de mousses, de lichens qui abritent les formes hivernantes d'un grand nombre d'insectes parasites (œufs, larves, adultes) tels que Cochenilles, Araignées rouges, Pucerons, Chenilles...

La remise en état de ces arbres implique :

des mesures de nettoyage telles que la taille des arbres pour éliminer les branches mortes, porteuses de chancres, les fruits momifiés par le monilia, la maladie des pochettes, etc...

- des traitements chimiques réalisés à forte pression au moyen de pulvérisateurs munis de lance.

Les produits recommandés sont les suivants :

- Les huiles de goudron ou d'anthracène qui provoquent la chute des vieilles écorces, la destruction des mousses ainsi que des œufs et larves d'insectes ; la dose d'emploi est de 5 à 7 litres des spécialités commerciales.

- Les huiles blanches d'hiver à la dose de 4 % ont une action contre les cochenilles mais n'ont pas de pouvoir décapant comme les précédentes.

- Les huiles jaunes (huile blanche + colorant nitré) à la dose forte de 5 % ont une action de nettoyage sur les écorces, agissent également sur les pontes d'insectes.

Il est recommandé de respecter les doses préconisées par les fabricants selon les espèces fruitières (arbres à pépins ou à noyau).

Les oléo-parathions (mélange d'huile blanche et de parathion) ne s'utilisent qu'au printemps en traitement de pré-débourrement.

Chancres commun du pommier

L'élimination des chancres à nectria doit être suivie d'une désinfection des plaies à l'aide de spécialités adéquates telles que : Kankertox, Santar, Quinochancre. Les plaies laissées par la taille des rameaux seront aussi désinfectées notamment par pulvérisations cupriques.

Les Contrôleurs chargés des
Avertissements Agricoles.

l'Inspecteur de la Circonscription
Phytosanitaire CHAMPAGNE